

CALENDRIER VACCINAL CHEZ LA FEMME ENCEINTE



dès le premier trimestre à partir de l'auto-immune jusqu'à janvier

GRIPPE SAISONNIÈRE ET COVID-19 :

Se protéger des risques de complications respiratoires et cardiaques avec hospitalisation en unité de soins intensifs.

1

Protéger son enfant de la prématurité, des risques hospitalisations et des complications graves dans les 6 premiers mois de vie.

2

de 32 à 36 semaines d'aménorrhée

VRS Virus des Bronchiolites du Nourisson

Protéger son enfant dans les 6 premiers mois de vie des formes graves de la bronchiolite avec les anticorps transmis par la mère.

1

Si pas de vaccination pendant la grossesse, **possible vaccination du nouveau-né** avant sa sortie de maternité

2

de 20 à 36 semaines d'aménorrhée

COQUELUCHE

Protéger son enfant les 2 premiers mois de sa vie des formes graves avec les anticorps transmis par la mère.

INFORMATIONS UTILES

La vaccination grippe, COVID-19 et coqueluche peut être associée.

La vaccination grippe, COVID-19 et VRS peut être associée.

Attendre au moins 15 jours entre les vaccinations coqueluche et VRS.

Centre Hospitalier
Simone Veil
Beauvais

